

فلوچارت مواجهات شغلی

پاشیدن خون یا سایر ترشحات در غشاء مخاطی (ملتحمه و دهان و بینی)
آسیب پوستی با سرسوزن ، نیدل آنژیوکت و یا هر ابزار نیز دیگر

خودداری از مالش موضعی چشم ها ، خودداری از فشار دادن محل آسیب دیده
شستشوی چشم و غشاء مخاطی با مقادیر زیاد آب در صورت آلودگی
شستشوی زخم با آب صابون به مدت ۵-۱۰ دقیقه و
عدم استفاده از هرگونه ضد عفونی کننده ها

مورد که با * مشخص
میشود فقط مربوط به
همان کادر است

اطلاع به سوپر وایزر کنترل عفونت یا سوپر وایزر بالینی

آیا منبع مشخص است؟

بله

خیر

مشاوره عفونی و انجام سرولوژی
HCV Ab
Baseline , HIV Ab , HBsAg
۱.۵ ماه، ۳ ماه و ۶ ماه بعد از مواجهه از
پرسنل آسیب دیده

بررسی پرونده بهداشتی پرسنل
و در صورت نیاز ارسال نمونه
خون جهت

نمونه از منبع جهت
HCV, HIV, HBV

منفی

اقدام نیاز نیست

تزریق HBIG قبل از
۴۸ ساعت و یک نوبت
هکساکس، هپاتیت B

مشاوره عفونی و انجام سرولوژی
HIV , HBsAg
* HCV (Baseline)
1.5 و ۳ ماه و ۶ ماه بعد از پرسنل

تکرار آزمایشات ۱.۵ و ۳ و ۶
ماه بعد از فرد آسیب دیده

HIV Test
منفی

خیر

بله

توقف
کمپرو و فیلاکسی

پرسنل اصول مواجهات شغلی را طبق الگوریتم رعایت نموده
است

واحد کنترل عفونت
بیمارستان
مهر ۱۳۹۸

HBV

Ab > 10

بله

خیر

منبع HBV مثبت
است؟

* منبع HCV مثبت
است؟

منفی

خیر

بله

درمان HCV بر
اساس اندیکاسیون

HCV

مثبت

HIV
Rapid test

منفی

منبع HIV مثبت
است؟

شروع فوری
کمپرو و فیلاکسی

درمان HIV بر
اساس اندیکاسیون

مثبت