

داروهای خود به خود متوقف شونده

داروهای خود به خود متوقف شونده به داروهایی گفته می شود که پس از گذشت مدت زمان معینی با توجه به علائم بالینی بیمار مصرفشان نباید ادامه یابد و بیمار جهت ادامه درمان باید مجدداً توسط پزشک مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و یا در صورت قطع مصرف باید از پزشک معالج دستورمجدد گرفته شود.

این لیست با توجه به لیست موجود در منابع علمی به صورت کلی میباشد و قطعاً داروهای هر دسته دارویی به صورت جداگانه و در اندیکاسیونهای متفاوت زمان توقف خاص خود را دارا میباشد.

برای مثال در دسته داروهای NSAIDs داروی کتورولاک به علت مشکلات کلیوی و گوارشی تا حداکثر ۵ روز میتواند تجویز شود ولی ایبوپروفن تا ۱۰ روز به عنوان ضد درد و ۳ روز به عنوان ضد تب میتواند استفاده شود.

نام دارو	فواصل ارزیابی مجدد
آنتی بیوتیک ها (تزریقی و خوراکی) بجز داروهای ضد سل و ایدز	۷ روز
آنتی بیوتیک های موضعی	۱۰ روز
ضد قارچ های موضعی	۳۰ روز
داروهای مخدر تزریقی به جز متادون	۴۸ ساعت
پچ فنتانیل	۳ روز
داروهای خواب آور	۱۴ روز
داروهای ضداضطراب و اختلالات روانی	۱۴ روز
ضد تشنج ها	۷۲ ساعت
محلولهای استثنایی بوسیله نبولایزر	۷ روز
فرآورده های چشمی (بجز در موارد گلوکوما و لوبریکانت ها)	۷ روز
تنگ کننده های عروق (چشمی و بینی)	۳ روز
هپارین و انوکسپارین	۷ روز
وارفارین	۱۴ روز
NASIDs	۱۰ روز
ضد التهاب و ضد دردهای مهارکننده COX II	۱۰ روز
کتورولاک تزریقی	۵ روز
کورتیکواستروئیدها (چشمی و خوراکی)	۱۰ روز
کورتیکواستروئیدها (بجز داروهای موضعی)	۷ روز
کرمها، پمادها و لوسیون های موضعی حاوی کورتیکواستروئیدها	۲۸ روز
مولتی ویتامین ها، منیزیم هیدروکساید، استامینوفن	۳۰ روز
اندانسترون	۲۴ تا ۴۸ ساعت

مسئول فنی داروخانه

دکتر شهرزاد اسدی